




### 3. Thyreophora

#### 3.1 Urtümliche Thyreophora

Die urtümlichen Thyreophora („Schildträger“) ernährten sich von Pflanzen und waren bis zu vier Meter lang. Sie traten zwischen der Oberen Trias bis zur Unteren Jura auf und trugen bereits kleinere Höcker auf ihrem Rücken.

<p><b><i>Scelidosaurus</i></b> Zeit: Jura 203-194 Fundort: USA, GB und Tibet Länge: 4 m Höhe: 1,2 m Gewicht: 250 kg</p>	 <p>Rekonstruktionsbild vom Scelidosaurus Quelle: Balista (<a href="#">CC BY-SA 3.0</a>)</p>
<p><b><i>Scutellosaurus</i></b> Zeit: Trias-Jura 213-194 Fundort: Arizona, USA Länge: 1,2 m Höhe: 0,4 m Gewicht: 10 kg</p>	 <p>Rekonstruktionsbild vom Scutellosaurus Quelle: Nobu Tamura (<a href="#">CC BY-SA 2.5</a>)</p>
<p><b><i>Tatisaurus</i></b> Zeit: Jura 203-196 Fundort: Yunnan, China Länge: 2 m Höhe: 0,6 m Gewicht: 50 kg</p>	 <p>Rekonstruktionsbild vom Tatisaurus Quelle: Ian Webster (<a href="#">CC BY-SA 4.0</a>)</p>
<p><b><i>Emausaurus</i></b> Zeit: Jura 183-174 Fundort: Grimmen (M-V), Deutschland Länge: 2 m Höhe: 0,7 m Gewicht: 70 kg</p>	 <p>Rekonstruktionsbild vom Emausaurus Quelle: Robinson Kunz (<a href="#">CC BY-SA 4.0</a>)</p>